



poddeblo: *Magnoliophytina (Angiospermae)* - kritosemenke

razred: *Magnoliopsida (Dicotyledonae)* - dvokaličnice


red: *Asterales* - košarnice

družina: *Asteraceae - nebinovke*



predstavnik: *Tussilago farfara* - navadni lapuh



Različne oblike koškov



$\text{♀} \downarrow K_0 C_{(5)} A_0 G_{\overline{(2)}}$



$\text{♂} * K_0 [C_{(5)} A_{(5)}] G_{\overline{(2)}}$

Značilnosti družine nebinov:

Enoletnice, dvoletnice ali zelnate trajnice. Listi so celi ali pernato deljeni, razvrščeni premenjalno, redkeje nasprotno ali vretenčasto, brez prilstov. Cvetovi so združeni v košek, ki ga obdajajo ovojkovi listi. Na cvetišču so lahko ščetinasti predlisti posameznih cvetov. Cvetovi so cevasti, dvospolni in jezičasti, navadno samo ženski. Prašnikov je 5, prašnice so zrasle okoli vrata pestiča. Plodnica je zrasla iz 2 plodnih listov, podrasla, 1-predalasta. Plod je orešek (rožka), na njem so lahko iz čaše nastalo padalce, ščetine ali nazobčan rob (kodeljica).

Nekateri pogostejši rodovi v Sloveniji:

Eupatorium - konjska griva, *Bellis* - marjetica, *Aster* - nebina, *Inula* - oman, *Buphthalmum* - primožek, *Galinsoga* - rogovilček, *Achillea* - rman, *Leucanthemum* - ivanjščica, *Tussilago* - lapuh, *Senecio* - grit, *Carlina* - bodeča neža, *Cirsium* - osat, *Centaurea* - glavinec.